

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

D L P 15-10-91 177779



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGIO -

☎ 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 207
du 11 Octobre 1991


AGRUMES

Cératite

Actuellement les clémentines "tournantes" deviennent attractives pour les mouches et sont très exposées aux piqûres.

Les captures augmentent régulièrement dans certains vergers précoces ; dans ce cas, il convient d'être très vigilants et de visiter régulièrement les pièges.

Un traitement sur le pourtour du verger est alors conseillé lorsque le piège capture une mouche par jour.



- Attractif Buminal et un insecticide
Lebaycid ou Authiofort

Mouche méditerranéenne femelle

Se rappeler que les spécialités à base de Diméthoate sont interdits contre la "mouche des fruits" (voir liste des produits conseillés).

- Attention à la proximité des kakis (plaqueminiers de jardin) très attractifs.

KAKIS VERGERS

Dans les vergers de kakis, "Sharon et Fuyu" utiliser la même stratégie. Surveillance régulière impérative.

Cicadelles vertes

Les captures augmentent, les clémentines tournantes sont aussi exposées à leur piqures (tâches claires puis sombres provoquées par des cellules vidées de leur contenu)


Intervenir en cas de besoin (voir bulletin n° 206).

OLIVIERS

- les captures de Dacus "mouches de l'olive" augmentent sensiblement ; les seuils sont souvent dépassés.

- Il est encore temps d'intervenir notamment où les traitements n'ont pas encore été déclenchés.

- Au besoin, renouveler l'intervention.



Mouche de l'olive

C'est une des plus belle récolte des
dix dernières années
" Sachons la conserver"

MAIERES ACTIVES UTILISABLES CONTRE LA MOUCHE MEDITERRANNEE

=====

Mélanger le BUMINAL à un insecticide homologué

Matières actives	Spécialité	Action	Dose	Délai avant récolte
- Formothion	ANTHIOFORI	Systémique contact (action lente)	40,56 g/hl	7 jours
- Fenthion	LEBAYCID	Contact ingestion inhalation	55 g/hl	15 jours
- Malathion	N.S.	Contact ingestion vapeur	100 g/hl	7 jours
- Trichlorfon	DIPIEREX 80	Contact Ingestion inhalation	100 g/hl	7 jours
Ces produits ont une persistance d'action de deux à trois semaines				
Persistance d'action : 8 jours				
Persistance d'action : 10 à 15 jours				